

No comer ni beber antes de cirugías, pruebas y procedimientos

Los niños deben tener el estómago vacío cuando se los duerme en una cirugía, procedimiento o prueba. Les damos anestesia general para que duerman. La comida o líquido dentro del estómago podría subir y meterse en los pulmones. Esta situación puede causar problemas graves y ser mortal. Si no sigue estas indicaciones, la cirugía, prueba o procedimiento se postergarán o cancelarán.

Fecha y hora de llegada al hospital (por lo general dos horas antes de la hora del procedimiento):
Hora: _____

Líquidos claros

- Son líquidos a través de los cuales se puede ver como agua, jugo de manzanas, Gatorade, Pedialyte u otros jugos claros. No es jugo de naranja.
- La última bebida será **2 horas** antes de la hora indicada arriba.

Hora: _____

Leche materna

- Último amamantamiento **4 horas** antes de la hora indicada arriba.

Hora: _____

Fórmula infantil

- Última alimentación con **fórmula infantil 6 horas** antes de la hora indicada arriba.

Hora: _____

Para otras comidas y líquidos

- Última alimentación **6 horas** antes de la hora indicada arriba.

Hora: _____

Medicamentos

- Si el niño toma medicamentos, pregúntele al médico qué debe hacer el día de la cirugía.



Si tiene preguntas llame al departamento de preoperatorio de Phoenix Children's Hospital:
602-933-1511 Lunes a viernes de 6 am a 2 pm

Después de leer esta información, dígame al enfermero o médico cómo preparará al niño para la cirugía, prueba o tratamiento. (Marcar después de hacerlo.)